

داروهایی که مصرف آنها، ممکن است به طور کاذب، جواب تست اعتیاد را مثبت کند

داروی مداخله کننده	ماده ی مورد بررسی	داروی مداخله کننده	ماده ی مورد بررسی
دکسترومتورفان	<b>اپیوئیدها(تریاک و ...)</b>	آمانتادین	<b>آمفتامین و متامفتامین (شیشه و ...)</b>
دیفن هیدرامین		بوپروپیون	
کدئین، مورفین		کلرپرومازین	
ریفامپین		دزیپرامین	
وراپامیل		دکستروآمفتامین	
کینین		افدرین	
فلوروکینولون ها*		ایزوکسوپرین	
دکسترومتورفان	<b>فن سیکلیدین</b>	لابتالول	
دیفن هیدرامین		متیل فنیدیت	
ایبوپروفن		فنیل افرین	
ایمی پرامین		فنیل پروپانول آمین	
کتامین		پرومتازین	
مپریدین		سودوافدرین	
تیوریدازین		رانی تیدین	
ترامادول		ریتودرین	
ونلافاکسین	سلژیلین		
سرترالین	<b>بنزودیازپین ها</b>	تیوریدازین	<b>کانابینوئید(حشیش و ...)</b>
کاربامازپین	<b>ضد افسردگی های سه حلقه ای</b>	ترازودون	
سیپروهپتادین		تریمیپرامین	
دیفن هیدرامین		سرترالین	
هیدروکسی زین		افاویرنز	
کوئتیاپین	<b>باربیتورات</b>	ناپروکسن	
ایبوپروفن		پیروکسیکام	
ناپروکسن	<b>ال اس دی</b>	امپرازول	
آمی تریپتیلین		پنتوپرازول	
دی سیکلومین		لانسوپرازول	
ارگوتامین		تولمتین	
پرومتازین		پرومتازین	
سوماتریتپتان	<b>کوکائین</b>	کلرپرومازین	<b>متادون</b>
آموکسی سیلین		کلومیپرامین	
چای برگ کوکا		دیفن هیدرامین	
بی حس کننده های موضعی حاوی کوکائین			
الکل های زنجیر کوتاه مانند : ایزوپروپیل الکل	<b>الکل</b>	ایبوپروفن	
		کوئتیاپین	
		تیوریدازین	
		وراپامیل	

reference :

Mayo Clinic Proceedings. January2008;83(1):66-76.(http:// www.mayoclinicproceedings.com)

گردآورنده: دکتر سعیده میر احمدی و دکتر شیوا خوشنویس انصاری