

دوره حمله ای گروه درمانی دوم + استرپتومايسين روزانه در دو ماه اول

دوره حمله ای (در هر دو گروه درمانی ۱ و ۲)			
تعداد قرص دو ترکیبی در روز (H75 R150) ***	ترکیبی در روز تعداد قرص چهار (H75 R150 E275 Z400)	گروه وزنی	
	2	30-35 Kg	
1	2	36-39 Kg	
	3	40-49 Kg	
1	3	50-52 Kg	
	4	53-70 Kg	
	5	کمتر از ۶۰ سال	>70 Kg
	4	۶۰ سال و بالاتر	

دوره نگهدارنده

گروه درمانی ۲			گروه درمانی ۱		
تعداد قرص دو ترکیبی در روز (H75 R150) ***	تعداد قرص سه ترکیبی در روز (H75 R150) (E275)	گروه وزنی	تعداد قرص دو ترکیبی در روز (H75 R150)***	گروه وزنی	
	2	30-35 Kg	2	30-35 Kg	
1	2	36-39 Kg	3	36-49 Kg	
	3	40-49 Kg	4	50-70 Kg	
1	3	50-52 Kg	5	کمتر از ۶۰ سال	>70 Kg
	4	53-70 Kg	4	۶۰ سال و بالاتر	

***چنانچه دوز قرص دو ترکیبی در دسترس (H150 R300) باشد، مقدار داروی روزانه فوق الذکر باید نصف شود

به پیوست جدول نحوه تجویز داروهای ترکیبی ضد سل در افراد بزرگسال دارای وزن ۳۰ کیلوگرم و به بالا به تفکیک گروه های درمانی و دوره درمانی حمله ای و نگهدارنده، حضورتان ارسال می گردد.

از آنجائیکه در فاز جابجائی مصرف داروهای غیر ترکیبی به داروهای ترکیبی هستیم، لازمست موارد ذیل اجرا و به دقت پایش شوند:

- ۱- می بایست جدول بلافاصله در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه، توزیع گردد.
- ۲- می بایست پایش و نظارت بر توزیع و تجویز داروها و مکان نگهداری داروها با دقت صورت گیرد.
- ۳- اطمینان حاصل نمائید، موجودی داروهای غیر ترکیبی (ایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول و پیرازینامید) به اندازه مورد نیاز برای گروه های زیر موجود باشد:

(i) افراد بزرگسال زیر ۳۰ کیلوگرم

(ii) کودکان

(iii) به تعداد ۲٪ کل بیماران که احتمالاً دچار عارضه دارویی شوند

(iv) ایزونیازید برای موارد نیازمند پروفیلاکسی