

بخشنامه سفتریاکسون

با توجه به ثبت 71 مورد مرگ مشکوک به مصرف سفتریاکسون طی سالهای 1377 الی شهريور 1390 در مرکز ADR ايران، و نظر به اينکه آين فرآورده بيشترین تعداد عوارض (2388) مورد از 28251 مورد بيمار دچار عارضه به ثبت رسیده در مرکز ADR (ايران) و نيز بيشترین تعداد موارد مرگ مرتبط با مصرف دارو را در بانك اطلاعاتي عوارض به ثبت رسیده در مرکز ADR ايران به خود اختصاص مى دهد، رعایت موارد زير توسيط کلیه شاغلين حرف پزشكى در تمامي مراکز درمانى دولتى و خصوصى الزامي است، بدینه است عدم رعایت موارد زير، پيگرد قانوني خواهد داشت و براساس قانون پرخورد خواهد شد.

-1- از تجويز و مصرف سفتریاکسون در مواردي مانند سرماخوردگى و سایر مواردي که از جمله موارد مصرف تأييد شده اين فرآورده نیست، جدا خودداری شود.

-2- از تزریق سريع وريدي سفتریاکسون جدا خودداری شده، انفوزيون وريدي در محلول مناسب حداقل 15 الى 30 دقیقه به طول انجامد.

-3- پيش از تجويز يا تزریق سفتریاکسون، حتماً در مورد سابقه حساسيت دارويي بيمار شبيت به سفتریاکسون يا سایر سفالوسپورين ها (مانند سفالكسين، سفالوتين، سفيكسيم، سفتازيديم، سفازولين و ...) يا پني سيلين ها، از بيمار سوال شود، مصرف سفتریاکسون در بيماران با سابقه حساسيت به سفتریاکسون يا سایر سفالوسپورين ها ممنوع مى باشد. همچنين با توجه به حساسيت متقطع پني سيلين ها و سفالوسپورين ها، در صورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلين ها نيز تجويز اين فرآورده فقط در موقع بسیار ضروري و با احتیاط فراوان صورت پذيرد.

-4- تزریق سفتریاکسون باید صرفاً توسيط افراد مجرب، در مراکز مجهز به سیستم احیاء انجام گيرد و از تزریق توسيط افراد غيرحرقه اي يا در مكانهای غير از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیاء جدا خودداری شود.

-5- مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولها يا فرآورده هاي حاروي کاسيم در نوزادان حتی به صورت انفوزيون از رگهای متقاوم ممنوع مى باشد.

6- حتی الامکان از مصرف محلولها یا فرآورده های حاری کلسیم تا 48 ساعت پس از آخرین دوز سفتیریاکسون در تمام گروه های سنی اجتناب گردد.

7- مصرف سفتیریاکسون در نوزادان مبتلا به هایپر بیلی رویینمیا، برویله نوزادان نارس، ممنوع می باشد. مطالعات نشان راوه است که سفتیریاکسون قادر به جابجایی بیلی روپین از محل اتصال به آلبومین سرم می باشد و لذا امکان ایجاد انسفالوپاتی ناشی از افزایش بیلی روپین در این بیماران مطرح می باشد.

8- استفاده از رقیق کننده های حاری کلسیم، مانند محلول رینگر، به منظور آماده سازی سافتیریاکسون چهت تزریق، ممنوع می باشد.

9- مسئولین فنی داروخانه ها باید از تحویل بدون نسخه این فرآورده (همانند سایر داروهای تحت نسخه) جدا خودداری نمایند، بدیهی است تحویل بدون نسخه دارو توسط داروخانه پیگرد قانونی خواهد داشت و براساس قانون پرخورد خواهد شد.