



پایش مراقبت کودک پسر

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی / مطب / مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشد.



نام و نام خانوادگی کودک:
تاریخ تولد: روز.....	ماه..... سال.....
کد ملی کودک:
کد ملی سرپرست کودک:
مشخصات زمان تولد: وزن.....	قد..... دور سر.....
هفتته بارداری هنگام زایمان:
تلفن تماس:
تاریخ مراجعه بعدی: روز.....	ماه..... سال.....

- غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم انجام می شود و تکرار آن در ۲، ۶ و ۱۰ هفتگی پس از تولد انجام می شود.
- در صورت ترخیص، نوزادان تا رسیدن به وزن ۲۰۰۰ گرم، هفتگی مراقبت شوند و پس از آن در ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی و سپس در ۲، ۳، ۴ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک مراجعه کنند.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنند.

- شیر مادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکتان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیر مادر را ادامه دهید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین اصلاح شده ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۳۶، ۲۴، ۴۸ و ۶۰ ماهگی کودکتان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرين مناسب با کودکتان طبق بروشورهای دریافتی، به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحويل دهید.
- سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.
- مکان نگهداری نوزاد در منزل کم نور، دنج و بدون سرو صدا باشد.
- از کارهای پرسو صدا بر بالین نوزاد خودداری نمایید.
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد باعث دلبستگی مادرانه، افزایش قابل توجه شیر مادر، کاهش اضطراب مادر، افزایش رشد شناختی شیرخوار، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد، ارتباط متقابل مادر و شیرخوار و درنهایت سرعت رشد جسمی، ارتقای تکامل و شکوفایی استعدادهای بالقوه شیرخوار می شود.

غربالگری‌های کودک

آزمون غربالگر	تاریخ انجام غربالگری	نتیجه غربالگری	نیازمند ارجاع	نام یا مهر غربالگر
هیپوتیروئیدی				
فنتیل کتونوری				
شنوایی				
بینایی				
معاینه چشم (رتینوپاتی نوزادی / ROP)				

پرسشنامه ASQ	۲ ماهگی	۶ ماهگی	۹ ماهگی	۱۲ ماهگی	۱۸ ماهگی	۲۴ ماهگی	۳۶ ماهگی	۴۸ ماهگی	۶۰ ماهگی
									نمره حیطه ارتباط
									نمره حیطه حرکات درشت
									نمره حیطه حرکات ظریف
									نمره حیطه حل مسئله
									نمره حیطه شخصی- اجتماعی
									وجود نگرانی در قسمت کلیات
									ASQ:SE نمره
									کودک نیازمند ارجاع

با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

سن	نوع واکسن	سن	نوع واکسن
بدو تولد	ب ث ژ*-فلج اطفال خوراکی - هپاتیت ب	۱۲ ماهگی	MMR
۲ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه **	۱۸ ماهگی	سه گانه - فلچ اطفال خوراکی - MMR
۴ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه - فلچ اطفال تزریقی	۶ سالگی **	سه گانه - فلچ اطفال خوراکی
۶ ماهگی	فلج اطفال خوراکی - پنج گانه - فلچ اطفال تزریقی		

توضیحات: * پس از رسیدن وزن شیرخوار به ۱۵۰۰ گرم واکسن ب ث ژ تلقیح شود. ** واکسن پنج گانه شامل دیفتری، کراز، سیاه‌سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ ب می‌باشد. *** پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دو گانه بزرگسالان باید تزریق شود. توصیه می‌شود برای شیرخواران و خانواده آن‌ها که در فصول سرد سال به ۶ ماهگی رسیدند واکسن آنفلوآنزا تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

نوع واکسن	تاریخ مراجعة	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	نوع واکسن	تاریخ مراجعة	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	تاریخ مراجعة	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	تاریخ مراجعة	سریال واکسن	نوع واکسن
بدو تولد				پنج گانه (DTP-Hep-B-Hib)									ب ث ژ (BCG)
بدو تولد				پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (OPV)
بار اول			بار اول	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار دوم			بار دوم	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار سوم			بار سوم	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار دوم			بار اول	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار دوم			بار دوم	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
یادآور ۱			بار اول	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
یادآور ۲			بار دوم	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار اول			بدوتولد	پنج گانه (DTP/Hib)									پنجه (DTaP)
بار دوم													

- سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.
- قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی را سوال کنید. پس از تاریخ واکسیناسیون حداقل ۲۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.
- جهت تسکین درد، بی قراری یا تپ راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تپ بالا یا هرگونه عارضه شدید یا غیرمعمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

نولد تا پایان شش ماهگی

شیوه خوار ۸ تا ۱۲ با در شبکه روز

- تغذیه با شیر مادر برای تقویت سیستم ایمنی، رشد و تکامل شیرخواران بسیار اهمیت دارد.
 - شیر مادر به تنها تا پایان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخواران کافی است، تا سالگی ادامه دهد.
 - از ۴ ماهگی تا پایان یک سالگی ابتدا کودکان را با شیر مادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
 - تغذیه تمکیلی را از یک نوع ماده غذایی به مقدار $1\text{~}2$ تا $1\text{~}3$ قاشق غذاخوری 2 تا 3 بار در روز شروع کنید و سپس این مقدار را به نصف لیوان برسانید.
 - اضافه کردن هر ماده غذایی جدیدی را طی 5 روز انجام دهید.



شروع ماه هفت میلادی پایان ماه یازدهم

سپهوار مقبار و قوات ان افريش بهمچو کند + ۲ میان و عده مقندي
قرآن هاه را بازیابي میکند + ۱ آمان و عده مقندي
بله درین دشوه، غذائي اگلشی خداها را بخدمات گوچ به کوکان بددهد. از دادن غذائي کوچ سفت با خود خوش



شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بر طبق میل کودک ادامه دهید. ابتدا به کودکتان غذا بدهید و سپس او را با شیر مادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودکتان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبندیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدهید.
- تا ۲ سالگی لبندیات پر چرب و پس از آن لبندیات کم چرب بدهید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدهید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدهید. (معده کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد).
- یک تا دو بار میان وعده مغذی در بین وعده‌های اصلی غذا به او بدهید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودکتان باشد.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدهید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و پیش از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجاری به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذاهای سفره خانواده به کودک بدهید.
- به کودکتان آب میوه و نوشیدنی‌های تجاری ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی‌کنند.
- به کودکتان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

علائم هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند با کمک بنشیند. • غان و غون نمی کند (درآوردن صدای ایمانند «ماما»، «بابا»، «دادا») • در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. • با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. • به نظر نمی رسد افراد آشنا را از گیریه ها تشخیص دهد. • به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. • اشیا را دست به دست نمی کند. 	۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • به صدای های بلند پاسخ نمی دهد. • اشیای در حال حرکت را بنگاه دنبال نمی کند. • به اشخاص لبخند نمی زند. • دستش را به دهان نمی برد. • وقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد. 	۲ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند چهار دست و پا برود. • نمی تواند با کمک بایستد. • برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند. • کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید. • بای بای یا سرسی کردن را یاد نمی گیرد. • به اشیا اشاره نمی کند. • مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد. 	۱ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی تواند بعفو کند یا صدای های دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پایه ایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی تواند یک یا هر دو چشم مش را در همه جهات حرکت دهد. 	۴ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیا، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد. • نمی تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیایی آشنا را نمی داند. • نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی گیرد. • نمی تواند حدائق ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب اوراترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد. • مهارت هایی را که قبل از دست آورده بود از دست می دهد. 	۱۸ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار داردن برساند. • توجهی به مراقب خود نمی کند. • به صدای های اطرافش واکنش نشان نمی دهد. • به هیچ طرف غلت نمی زند. • نمی خنده یا جیغ نمی کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای) 	۶ ماهگی

برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند، تا ۲ سالگی سن اصلاح شده آنها محاسبه شود. سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / به هر روز سوال کنید.

علاوه هشدار دهنده تکامل


<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپردازد. • سایر کودکان را نادیده می گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده، پاسخ نمی دهد. • در مقابل لباس پوشیدن، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می کند. • نمی تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را رک نمی کند. • از ضمایر من و تو درست استفاده نمی کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبلاً به دست آورده بود از دست می دهد. 	۴ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی کند (مثال: شیر می خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی داند. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنها یعنی راه نمی رود. • مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد. 	۲ سالگی
<ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افراطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیر معمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار تهمی. • معمولاً گوشه گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تم رک کند. • به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست. • نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجارتی صحبت کند. • نمی تواند نقاشی بکشد. • نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد. • مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد. 	۵ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> • زیاد زینین می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند. • آبرینش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی تواند جمله بگوید. • بازی تختیلی نمی کند یا آن ها را باور می کند. • نمی خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی ها بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی کند. • مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد. 	۳ سالگی

توصیه های ارتقای تکامل کودک

۲ سال و بزرگتر	۱۲ ماه تا ۲ سال	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۱ هفته تا ۶ ماه	تولد تا یک هفتگی
 <p>بازی: به کودک خود کمک کنید تا اشیا را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده پسازید. مثلاً اشیایی بارنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، برچسب یا تخته وایت برد و پازل.</p>	 <p>بازی: چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بجیند و داخل ظرف بیاندازد و در یاورد.</p>	 <p>بازی: اسباب بازی مورد علاقه نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یاروی هم می گذارند، پیدا کند. با کودک خود دالی طرف و گیره های لباس.</p>	 <p>بازی: وسائل خانگی تمیزو بی خطری را به کودک خود کنید. بینید آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به یاری خلوی او حرکت دهید تا بدھید تا دستکاری کند، به هم بزند و بیاندازد (مانند یک قاشق فلزی) شده است، جغجغه)</p>	 <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا بینند، پشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را نمی کند. اشیایی رنگی را به نوزاد خود فراهم کنید تا بینند، آن را بینند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)</p>	 <p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p>
 <p>ارتباط برقرار کنید: اوراشتوبیکنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهید. به کودکتان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب ها او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدھید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیا و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که جگونه با دست هایش اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهد و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: چیزهایی مثل بیانش چیزهایی مثل بیانش علائق کودک خود به صدا و علائق کودک خود باشد. به کودک خود لبخند بزنید و پاسخ دهید. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او را بینند.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت صدا را می بینند و صدایتان را می شنود.</p>	 <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید.</p>

به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به آنها پاسخ دهید. از علائق کودک خود مطلع شوید و به آنها پاسخ دهید.


نیودار قد دورس شیرخواران زود متولد شده پس



سن به هنگام از اولین روز آذربین قاعده


نمودار وزن شیرخواران زود متولد شده دختر

۲۷




سین به هفتاه از اوایل روز آشوبیں قاعده‌ی


نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (z-score) پسر



نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر



نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر



نمودار وزن برای سن از تولد تا ۵ سالگی (z-score) پسر

